

LES TRAITEMENTS DE L' HEPATITE C

# C'

MON TRAITEMENT

 **sos hépatites**  
Fédération

## Mon traitement est une combinaison de plusieurs médicaments

Plusieurs traitements sont disponibles contre le virus de l'hépatite C et d'autres vont arriver.

Les taux de réussite de ces traitements avec des molécules Antivirales à Action Directe (AAD) sont supérieurs à 90 % et dans certaines populations, ils atteignent 100 %.

Votre spécialiste vous prescrira les AAD qui vous conviennent le mieux en fonction de votre génotype, de votre stade de fibrose en tenant compte aussi de vos spécificités (co-infection VIH/VHC, surpoids, diabète, problèmes rénaux, addictions, traitements en cours ...)

### ATTENTION

Ces nouvelles molécules ne sont disponibles à ce jour que dans les pharmacies hospitalières.

Renseignez-vous sur les heures d'ouverture et de délivrance.  
(Organisez-vous si vous partez en vacances ou à l'étranger)

### CO-INFECTION VIH-VHC

Il n'est pas recommandé d'arrêter le traitement antirétroviral pour introduire le traitement de l'hépatite C.

Il est recommandé d'évaluer les interactions entre les molécules du traitement VHC avec les antirétroviraux.

Si nécessaire, avant l'initiation du traitement VHC, le médecin référent pour le VIH modifiera votre traitement antirétroviral pour éviter les interactions médicamenteuses.

**Le traitement VHC et les doses sont les mêmes que pour un mono-infecté VHC.**

Cependant, les interactions médicamenteuses peuvent influencer le choix des AAD et plus rarement les posologies de certains AAD.

## MON TRAITEMENT

SOVALDI® + DAKLINZA®	AVEC OU SANS	RIBAVIRINE	4/5		
SOVALDI® + OLYSIO®	AVEC OU SANS	RIBAVIRINE	6/7		
HARVONI®	AVEC OU SANS	RIBAVIRINE	8/9		
SOVALDI® + RIBAVIRINE			10/11		
VIEKIRAX®	AVEC OU SANS	EXVIERA®	AVEC OU SANS	RIBAVIRINE	12/13
GRAZOPREVR + ELBASVIR	AVEC OU SANS	RIBAVIRINE	14		
RIBAVIRINE			15		

### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Lors de votre consultation, précisez bien à votre hépatologue ou pharmacien **TOUS** les médicaments, plantes, traitement alternatif ou de phytothérapie que vous prenez.

Certaines associations de médicaments peuvent être dangereuses; baisser l'efficacité du traitement; provoquer des effets indésirables.

La liste des interactions est trop longue pour que nous puissions l'inclure dans ce livret.

**N'hésitez pas à nous contacter pour signaler tout effet secondaire**  
contact@soshepatites.org ou directement,  
sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament  
<http://ansm.sante.fr>

## SOVALDI® + DAKLINZA® AVEC OU SANS RIBAVIRINE\*

SOFOSBUVIR 400 mg    DACLASTAVIR 60 mg



\*RIBAVIRINE p. 15

### Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉE - TROUBLES DE L'ATTENTION  
**EXACERBATION DES MALADIES CARDIAQUES PRÉ-EXISTANTES** - INSOMMNIES  
**SENSATIONS D'HYPER-ACTIVITÉ** : D'ÊTRE « BOOSTÉ » D'AVOIR « LA PÊCHE »,  
 IRRITABILITÉ - APPÉTIT DIMINUÉ - TROUBLES DU SOMMEIL

### Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement, si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes interactions médicamenteuses. Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD. Vous pouvez vérifier sur le site : [www.hep-druginteractions.org](http://www.hep-druginteractions.org)

Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

**1 comprimé SOVALDI® + 1 comprimé DAKLINZA®**

le matin ou le soir **à la même heure** avec de la nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli (près des pilules, près de la brosse à dents...)

Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés

#### Si j'oublie mon comprimé SOVALDI®

à - **de 18h**, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + **de 18h**, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.


**JE NE DOUBLE  
JAMAIS MA DOSE**

**Si je vomis - de 2h** après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle suivante.

#### Si j'oublie mon comprimé DAKLINZA®

à - **de 20h**, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + **de 20h**, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants. 

LES INTERDITS

Le traitement ne doit pas être pris pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer pendant le traitement

**PAMPLEMOUSSE & MILLEPERTUIS**

#### SOVALDI®

Liste non exhaustive

<b>ANTIARYTHMIQUE</b>	Amiodarone
<b>ANALEPTIQUE</b>	Modafinil
<b>ANTICONVULSIVANTS</b>	Carbamazépine, Phénytoïne Phénobarbital, Oxcarbazépine
<b>ANTIMYCOBACTERIENS</b>	Rifabutine, Rifampicine, Rifapentine

#### DAKLINZA®

Liste non exhaustive

<b>ANTICONSULSIVANTS</b>	Phénytoïne, Carbamazépine ou Phénobarbital
<b>ANTITUBERCULEUX</b>	Rifampicine, Rifabutine
<b>GLUCOCORTICOIDES SYSTEMIQUES</b>	Déxaméthasone

## SOVALDI® + OLYSIO® AVEC OU SANS RIBAVIRINE\*

SOFOSBUVIR 400 mg SIMEPREVIR 150 mg



Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

**1 comprimé SOVALDI® + 1 comprimé OLYSIO®**

le matin ou le soir **à la même heure** avec de la nourriture.

Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli (près des pilules, près de la brosse à dents...)

Ne pas croquer ni casser en 2 le comprimé ou la gélule

### Si j'oublie mon comprimé SOVALDI®

à - **de 18h**, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à **+ de 18h**, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

**JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE**


Si je vomis - **de 2h** après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

### Si j'oublie ma gélule OLYSIO®

à - **de 12h**, je prends ma gélule oubliée et je prends la suivante à l'heure prévue habituellement.

à **+ de 12h**, je ne prends pas ma gélule oubliée et j'attends l'horaire de la prise suivante.

Si je vomis - **de 4h** après la prise de ma gélule, j'en reprends 1, sinon je prends ma gélule à l'heure habituelle.

Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants. 

LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer pendant le traitement

**PAMPREMOUSSE & MILLEPERTUIS**

\*RIBAVIRINE p. 15

## Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉE - DÉMANGEAISONS DE LA PEAU - ÉRUPTION CUTANÉE - CONSTIPATION - PRURIT  
AUGMENTATION DE BILIRUBINE DANS LE SANG  
SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE, ÉVITEZ TOUTE EXPOSITION AU SOLEIL OU AUX RAYONS U.V. ARTIFICIELS (CABINE DE BRONZAGE)

## Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement, si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes interactions médicamenteuses. Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD. Vous pouvez vérifier sur le site : [www.hep-druginteractions.org](http://www.hep-druginteractions.org)

### SOVALDI®

Liste non exhaustive

**ANTIARYTHMIQUE** Amiodarone  
**ANALEPTIQUE** Modafinil  
**ANTICONVULSIVANTS** Carbamazépine, Phénytoïne  
Phénobarbital, Oxcarbazépine

### OLYSIO®

Liste non exhaustive

**ANTICONVULSIVANTS** Phénytoïne, Carbamazépine  
Phénobarbital...  
**ANTITUBERCULEUX** Rifampicine, Rifabutine  
**GLUCOCORTICOIDES SYSTEMIQUES** Déxaméthasone  
**ANTIFONGIQUES** Azolés, Luconazole  
**ANTIBIOTIQUES DE LA CLASSE DES MACROLIDES** Erythromycine, Clarithromycine, Téli-thromycine  
**IMUNOSUPPRESSEUR** Ciclosporine

## HARVONI® AVEC OU SANS RIBAVIRINE\*

SOFOSBUVIR 400 mg  
+ LEDIPASVIR 90 mg



Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

**1 comprimé HARVONI®**

le matin ou le soir **à la même heure** avec de la nourriture.

*Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli (près des pilules, de la brosse à dents...)*

*Ne pas croquer ni casser le comprimé*

### Si j'oublie mon comprimé HARVONI®

à - **de 18h**, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à **+ de 18h**, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

**JE NE DOUBLE  
JAMAIS MA DOSE**

**Si je vomis - de 5h** après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

**Si je vomis + de 5h** après la prise de mon comprimé, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

### CONSEIL D'HÉPATANT :

Choisissez de prendre votre comprimé le soir.

*Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.*



**LES INTERDITS**

Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer pendant le traitement

**PAMPRE MOUSSE & MILLEPERTUIS**

\*RIBAVIRINE p. 15

## Les effets indésirables / secondaires

MAUX DE TÊTE - FATIGUE - NAUSÉES - IRRITABILITÉ - TOUX - PRURIT - MUSCLES DOULOUREUX - MAL AU DOS ET AUX ARTICULATIONS

**EN CAS DE FATIGUE APRES LA PRISE :** NE PAS CONDUIRE ET NE PAS UTILISER DE MACHINES

**EN CAS D'ANTÉCÉDENTS CARDIAQUES :** SURVEILLER LA TENSION ET LE RYTHME CARDIAQUE

INSOMNIES - SENSATIONS D'HYPER - ACTIVITÉ, D'ÊTRE « BOOSTÉ », D'AVOIR « LA PÊCHE »

## Les interactions médicamenteuses

**Si vous prenez un antiacide,**

prenez-le au moins 4h avant ou au moins 4h après HARVONI®

**Si vous prenez un inhibiteur de la pompe à protons,**

prenez-le au même moment qu'HARVONI®. Ne le prenez pas avant HARVONI®

Avant le début de votre traitement,

si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin

ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes interactions médicamenteuses.

Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.

Vous pouvez vérifier sur le site : [www.hep-druginteractions.org](http://www.hep-druginteractions.org)

### HARVONI®

Liste non exhaustive

**ANTIARYTHMIQUE** Amiodarone

ANALEPTIQUE Modafinil

ANTICONSULSIVANTS Carbamazépine, Phénytoïne  
Phénobarbital, Oxcarbazépine

ANTIMYCOBACTERIENS Rifabutine, Rifampicine, Rifapentine

## SOVALDI® + RIBAVIRINE\*

SOFOSBUVIR 400 mg 200 mg ou 400 mg



Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

**1 comprimé SOVALDI® en 1 prise (le matin **OU** le soir)  
+ RIBAVIRINE\* selon posologie :  
au minimum 800 mg ou au maximum 1200 mg  
en 2 prises (le matin **ET** le soir)**

**à la même heure** avec de la nourriture.

*Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli (près des pilules,  
de la brosse à dents...)*

*Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés*


### Si j'oublie mon comprimé SOVALDI®

à - **de 18h**, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à **+ de 18h**, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

**Si je vomis - de 2h** après la prise de mon comprimé, j'en reprends 1, sinon je prends mon comprimé à l'heure habituelle.

**JE NE DOUBLE  
JAMAIS MA DOSE**

*Je stocke mes comprimés à température ambiante,  
hors de portée des enfants.* 

**LES INTERDITS**

Le traitement **ne doit pas être pris**  
pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer  
pendant le traitement

**PAMPREMOUSSE  
& MILLEPERTUIS**

## Les effets indésirables / secondaires

FATIGUE - MAUX DE TÊTE - NAUSÉE

**TENSION** : À SURVEILLER QUAND PROBLÈMES CARDIAQUES

DOULEURS ABDOMINALES - INSOMMNIES

**SENSATIONS D'HYPER-ACTIVITE**, D'ÊTRE « BOOSTÉ », D'AVOIR « LA PÊCHE »  
ANÉMIE

## Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement,  
si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin  
ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes interactions médicamenteuses.  
Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD.  
Vous pouvez vérifier sur le site : [www.hep-druginteractions.org](http://www.hep-druginteractions.org)

### SOVALDI®

*Liste non exhaustive*

**ANTIARYTHMIQUE** Amodiarone

ANALEPTIQUE Modafinil

ANTICONVULSIVANTS Carbamazépine, Phénytoïne

Phénobarbital, Oxcarbazépine

ANTIMYCOBACTERIENS Rifabutine, Rifampicine, Rifapentine

## VIEKIRAX® AVEC OU SANS EXVIERA® AVEC OU SANS RIBAVIRINE\*

OMBITASVIR 12,5 mg  
+ RITONAVIR 50 mg  
+ PARITAPREVIR 75 mg

DASABUVIR 250 mg



\*RIBAVIRINE p. 15

### Les effets indésirables / secondaires

TRÈS GRANDE FATIGUE - NAUSÉE - TROUBLE DU SOMMEIL - DÉMANGEAISONS - PRURIT  
**EN CAS DE FATIGUE APRES LA PRISE : NE PAS CONDUIRE ET NE PAS UTILISER DE MACHINES**

**Lorsque vous prenez VIEKIRAX® avec ou sans EXVIERA®,** informez votre médecin si vous présentez l'un des symptômes suivants :  
- vous avez des nausées (mal au cœur), des vomissements ou une perte d'appétit  
- vous remarquez un jaunissement de votre peau ou du blanc de l'œil  
- vos urines sont plus foncées que d'habitude

#### TRAITEMENT CONTRE INDIQUÉ

**POUR LE TRAITEMENT DES CIRRHOSÉS DÉCOMPENSÉS : F4 CHILD B & C**

Ma dose par jour pendant 12 ou 24 semaines :

**2 comprimés VIEKIRAX® en une fois (le matin **OU** le soir) **AVEC** ou **SANS****

**1 comprimé EXVIERA® le matin **ET** 1 comprimé le soir à la même heure** avec de la nourriture.

*Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli (près des pilules, de la brosse à dents...)*

*Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés*

#### Si j'oublie mon comprimé VIEKIRAX®

à - **de 12h**, je prends mes comprimés oubliés et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + **de 12h**, je ne prends pas mes comprimés oubliés et j'attends l'horaire de la prise suivante.

**JE NE DOUBLE JAMAIS MA DOSE**

#### Si j'oublie mon comprimé EXVIERA®

à - **de 6h**, je prends mon comprimé oublié et je prends le suivant à l'heure prévue habituellement.

à + **de 6h**, je ne prends pas mon comprimé oublié et j'attends l'horaire de la prise suivante.

*Je stocke mes comprimés à température ambiante, hors de portée des enfants.*



**LES INTERDITS**

Le traitement **ne doit pas être pris** pendant la grossesse ou l'allaitement



Ne pas consommer pendant le traitement

**PAMPREMOUSSE & MILLEPERTUIS**

### Les interactions médicamenteuses

Avant le début de votre traitement, si vous prenez des médicaments, **donnez la liste** à votre médecin ou à votre pharmacien afin d'éviter toutes interactions médicamenteuses. Ne prenez aucun nouveau traitement sans l'accord du spécialiste des AAD. Vous pouvez vérifier sur le site : [www.hep-druginteractions.org](http://www.hep-druginteractions.org)

#### VIEKIRAX® & EXVIERA®

*Liste non exhaustive*

**ANTIARYTHMIQUE** Amiodarone  
STATINES Rosuvastine  
**ANTIGOUTTE** Colchicine  
**CONTRACEPTIFS** Contenant de l'éthinylestradiol

# MON TRAITEMENT

## GRAZOPREVIR + ELBASVIR AVEC OU SANS RIBAVIRINE\*

GRAZOPREVIR 100 mg ELBASVIR 50 mg

ATU\*\* nominative en FRANCE AMM Européenne EN COURS

Ma dose par jour pendant 12 ou 16 semaines :

**1 comprimé**

le matin ou le soir **à la même heure** avec de la nourriture.  
*Choisissez le moment qui évitera les risques d'oubli (près des pilules, près de la brosse à dents...)*

*Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés ou les gélules*


\*\* Génotypes 1 ou 4 avec troubles rénaux

## Les effets indésirables / secondaires

MAUX DE TÊTE - FATIGUE - NAUSÉE - DIARRHÉE

**A NOTER :** UNE ÉLÉVATION TRANSITOIRE DES TRANSAMINASES : ASAT ET ALAT

**N'hésitez pas à nous contacter pour signaler tout effet secondaire**  
contact@soshepatites.org ou directement,  
sur le site de l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament  
<http://ansm.sante.fr>

*Je stocke mes comprimés à température ambiante,  
hors de portée des enfants.* 

LES INTERDITS

Le traitement **ne doit pas être pris**  
pendant la grossesse ou l'allaitement



**Ne pas consommer**  
pendant le traitement

**PAMPLEMOUSSE  
& MILLEPERTUIS**

# MON TRAITEMENT

14/15

## COPEGUS® ou REBETOL® ou RIBAVIRINE

Dans certains cas, l'ajout de la RIBAVIRINE permet d'améliorer  
l'efficacité du traitement et donc du nombre de guérisons.  
Cela peut permettre aussi un traitement en 12 semaines au lieu de 24.

2 dosages existent :

Comprimé ou gélule de 200 mg ou de 400 mg.  
Votre médecin vous indiquera la dose à prendre  
celle du matin et celle du soir.

La RIBAVIRINE :

doit être prise le matin **ET** le soir avec de la nourriture «grasse»  
(tartine beurrée ou croissant ou yaourt par ex. au petit déjeuner).

*Ne pas croquer ni casser en 2 les comprimés ou les gélules*

## Les effets indésirables / secondaires

ANÉMIE LIÉE À LA DESTRUCTION DES GLOBULES ROUGES (HÉMOLYSE) QUI PEUT  
ENTRAÎNER UN MANQUE D'APPÉTIT, UNE GROSSE FATIGUE, DES PALPITATIONS,  
MAUX DE TÊTE, TOUX ET ESSOUFFLEMENT.  
GOÛT «DE FERRAILLE» APRÈS INGESTION.  
**RIBAVIRINE** CONTRE INDIQUÉE QUAND INSUFFISANCE RÉNALE SÉVÈRE.

**La grossesse est formellement contre indiquée pendant le traitement :**  
risques de malformation importants.  
Pour concevoir un enfant après le traitement, la femme attendra 4 mois  
et l'homme 7 mois.

Si l'homme commence un traitement alors que sa femme est enceinte,  
**préservatif obligatoire** pour empêcher le fœtus d'être en contact  
avec la ribavirine présente dans le sperme.

 **sos hépatites**  
Fédération

 **N° Vert 0 800 004 372**  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE




# UN TRAITEMENT POUR TOUS, UNE GUÉRISON POUR CHACUN ET UNE PROTECTION UNIVERSELLE !

*L'association SOS hépatites Fédération groupe des associations  
ayant pour but la prévention, l'information, la solidarité, la défense  
de toutes les personnes concernées  
par les hépatites virales et les maladies du foie.*

SOS hépatites Fédération  
Tour Gallieni 2- 36 av. du Général de Gaulle  
93170 Bagnole  
[www.soshepatites.org](http://www.soshepatites.org)



 Association SOS hépatites Fédération

 @SOSHepatitis

 **sos hépatites**  
Fédération

 **N°Vert** **0 800 004 372**  
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

