

**Etats Généraux
Hépatite B
Prades, 13 décembre 2019**

Dr André-Jean REMY
Service Expert de Lutte
contre les Hépatites Virales
Centre Hospitalier de Perpignan

L'hépatite B en résumé

- 10000 personnes contaminées
 - 100 hépatites fulminantes
 - 10000 porteurs chroniques
 - 7000 hépatites chroniques
 - 1000 cirrhoses
 - 300 cancers primitifs
- Contamination par sang et sécrétions sexuelles
- Traitement fonction de la charge virale B , des transaminases et de la fibrose
- **VACCIN EFFICACE**

MARQUEURS SEROLOGIQUES UTILES

Clinique	Ag HBs	Ac HBs	Ac HBc IgM	Ac HBc totaux	Ag HBe	Ac Hbe	ADN B
• Hépatite aiguë	+	-	+	+	+	-	+
• Sujet guéri	-	+	-	+	-	+	-
• Sujet vacciné	-	+	-	-	-	-	-
• “ Porteur sain ”	+	-	-	+	-	+	-
• Hépatite chronique +	-	-	+	+	-	+	+
• Virus Mutant	+	-	-	+	-	+	+

Hépatite B aiguë

- 1 788 cas d'hépatite B aiguë déclarés 2003-2018 (BEH 2019)
- Diminution depuis 2006: 185 en 2006 *versus* 59 en 2018
- âge moyen 40,2 ans / 72% d'hommes.
- 64% des cas rapportaient au moins une exposition à risque, → exposition sexuelle (56%) ou voyage en zone d'endémie (33%)
- 81% avaient indication vaccinale → 5% étaient vaccinés
- 65% ont été hospitalisés (65%) → surreprésentation des formes les plus sévères.

Prévalence

- Plus élevée chez les 46-75 ans (0,51%) / 18 à 45 ans (0,10%)
- Si revenu mensuel du ménage était faible (0,63%)
- Chez les bénéficiaires de la CMU ou de l'AME (1,98%)
- La prévalence était associée au lieu de naissance atteignant 5,81% pour les personnes nées en Afrique subsaharienne comparé à 0,14% pour les personnes nées en France métropolitaine.
- **Part de celles connaissant leur infection a été estimée à 17,5%**, ce qui correspond à 23 749 personnes âgées de 18 à 75 ans en population générale métropolitaine.
- 35,6% ont fait un test de dépistage pour l'hépatite B.
- Antécédents dépistage VHB augmentaient avec niveau d'éducation + en Ile de France ou dans une ville d'au moins 100 000 habitants **comparativement à ceux résidant dans une zone rurale**

Populations particulières (1)

- **Femmes enceintes**
- Enquête nationale périnatale (ENP) en 2016 des maternités de France entière une semaine donnée, la **prévalence (portage de l'AgHBs) 0,8%**
- 0,4% pour celles nées dans un pays de faible endémicité du VHB
- 1,1% pour celles nées dans un pays de moyenne endémicité
- 5,6% pour celles nées en pays de forte endémicité.
- Population afro-caribéenne d'Ile-de-France, l'enquête AfroBaromètre, en 2016 prévalence 5,1%
- 7,0% chez les personnes nées en Afrique subsaharienne
- 23% seulement connaissaient leur statut.
- **Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes**
- Prévagay 2015
- prévalence 0,6%
- HSH séropositifs pour le VIH 1,5%


Populations particulières (2)

- **Usagers PASS / PRECAVIR 2007-2015**, 2 870 personnes / 94% migrants majoritairement d'Afrique subsaharienne (66%) **7,4% VHB+**
- **Usagers de drogues** fréquentant les structures de prise en charge et de réduction des risques
- ANRS-Coquelicot 2011-2013 prévalence 1,4%
- 0,7% chez les usagers nés un pays de faible endémicité du VHB
- 2,2% chez ceux nés dans un pays de moyenne endémicité
- 7,6% chez ceux nés dans un pays de forte endémicité pour le VHB.
- **Population hospitalière**, données du PMSI → 0,11% proportion de patients hospitalisés avec un diagnostic principal, relié ou associé d'hépatite chronique B en 2010 et 2011.



Mortalité (BEH 2014)

- Entre 2004 et 2011, 54 409 patients avec hépatite B (161 387 hépatite C) ont été hospitalisés ;
- Prévalence hospitalière a augmenté de 0,09% à 0,11%)
- 4 965 VHB+ sont décédés (21 164 pour VHC) et d'HCC, sont décédés → **620 morts par an**
- Mortalité a augmenté de 4,9% à 7,7%
- Facteurs de risque associés au décès pour le VHB: résidence hors Île-de-France, l'âge ≥ 50 ans, les diagnostics de CHC et de dépendance à l'alcool

ALD



- SNIIRAM SNDS → ALD 6 hépatite chronique B = 27 328 personnes en 2016.
- Augmentation annuelle du nombre de personnes en ALD 6 comprise entre 3,7% et 10,6% depuis 2012.



Données HEPATER

- 20.990 patients, 14664 atteints d'hépatite C, **6254 d'hépatite B** et 91 VHC + VHB
- Patients étrangers
 - plus jeunes
 - moins F3F4
 - mais moins traités
 - avec moins de complications (cirrhoses CHC)

Données PIBAC

- 580 porteurs inactifs en CHG
- 107 suivis disponibles à 4 ans
- Pas de décès
- Pas de cirrhose
- Pas de cancer primitif du foie
- Pas d'évènement clinique suggérant décompensation

Merci
pour votre attention

